



太陽の子保育園

平成13年 5月

花の季節も過ぎ、新緑の5月を迎えました。

入園して早1ヵ月が経ち、子どもたちも園に慣れ、元気に遊びまわっています。

風邪もおちつき、こんどは水ぼうそうが流行しつつありますので園でも気をつけて観察していきます。ご家庭でもよろしく願います。なお、発病後に登園される時は、治癒証明書が必要です。担任または事務所で用紙をいただいで下さい。


予 防 接 種

◎ 予防接種の種類

生ワクチン	生きた病原体の毒性を弱めてつくり、その病気にかかったのに近い免疫をつくらうというものです ポリオ、麻しん(はしか)、風しん、BCG
不活化ワクチン トキシイド	不活化ワクチンは、病原体を殺し、免疫をつくるのに必要な成分を取り出して、毒性をなくしてつくれたものです。 トキシイドは、細菌が出す毒素を取り出して、その毒性をなくしたものです。
	百日せき、日本脳炎、ジフテリア、破傷風

◎ 接種間隔

予防接種と予防接種の間は、特別の場合以外は、決められた間隔をあけましょう。



◎ 接種時期

予防接種の通知のくる時期は地域によって多少違いがありますが、受ける時期は下記の表のようになっています。

予防接種にはそれぞれ適した年齢があります。標準の年齢内のなるべく早い時期に受けましょう。

◎ 予防接種を受ける時期：次の表を参考にしてください。

予 防 接 種 の 種 類	法で定められている時期 (H7.4.1.以降)	東京都における標準接種時期 (基本モデル)
BCG	○ 4歳になるまでに1回 ○ 小学校1年と中学1年 いずれもツベルクリン 反応陰性者	○ 3~4か月健康診査時 集団で ○ 同左・学校で
ポリオ	3か月~90か月の間2回	1回目 5か月より 2回目 1回目より6週間 経過後 } 春・秋に 集団で
百日咳 ジフテリア 破傷風 混合ワクチン (DPT)	第1期 初回 3~90か月 3~8週間 隔で3回 追加 初回終了後 6か月以上の 間隔をお いて1回 第2期(DT) 11~12歳	第1期 初回 6か月より 3~8週間隔で 3回 追加 初回終了後1年 で1回 第2期 小学6年生で
麻しん	12~90か月	12か月
風しん	12~90か月	18か月
日本脳炎	第1期 初回 6~90か月 1~4週間 隔で2回 追加 初回終了後 1年で1回 第2期 9~12歳 第3期 14~15歳	第1期 初回 3歳で 1~4週間隔で 2回 追加 4歳で 1回 第2期 小学4年生 第3期 中学2年生